

Effector[®]

Fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, upeņu, jāņogu, ērkšķogu un aveņu stādījumos

Reģistrācijas Nr.	0134
Reģistrācijas klase:	2.
Darbīgā viela:	ditianons 700 g/kg
Formulācija:	dispergējošas granulas
Iepakojums:	1 kg

Preparāta apraksts

Effector ir ditianonu saturošs kontaktiedarbības fungicīds, kurš ir efektīvs pret ļoti daudzām sēnišu ierosinātām slimībām augļu dārzos un ogulājos. Effector darbības ilgums ir no 7 līdz 14 dienām. Preparāts labi darbojas arī vēsos

laika apstākļos, tādēļ piemērots arī agrajām apstrādēm pavasarī. Vislabākos rezultātus var sasniegt, lietojot Effector profilaktiski vai pēc informācijas saņemšanas par slimību ierosinātāju sporu izlidošanas sākumu.

Lietošana

Ābeļu stādījumos Effector ir efektīvs pret:

ābeļu kraupi (*Venturia inaequalis*),
augļu rūgto puvi (*Gleosporium spp.*),
augļu parasto puvi (*Monilinia = Monilia spp.*),
rūsu (*Gymnosporangium juniperi-virginiana*),
augļu koku vēzi (*Nectria spp.*),
zaru un stuburu iedegām un citām slimībām.

1. un 2. apstrāde askusporu izlidošanas laikā un ābeļu ziedēšanas beigās ar **0.05 - 0.10% preparāta darba šķīdumu** (atbilst 5 - 10 g Effector uz 10 l ūdens)
3. un pārējās apstrādes ar **0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu** atkārtoti ar 8 - 14 dienu intervālu. Vislabāko efektivitāti ābeļu kraupja ierobežošanā var panākt, lietojot Effector sistēmā ar fungicīdu Candid (skat. 43. un 148. lpp.).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 6 reizes.
Nogaidīšanas laiks: 21 diena.

Bumbieru stādījumos Effector ir efektīvs pret:

augļu parasto puvi (*Monilinia = Monilia spp.*).

Apstrādāt bumbieres pumpuru plaukšanas laikā ar **0.10% preparāta darba šķīdumu** (atbilst 10 g Effector uz 10 l ūdens) un atkārtoti ar 7 - 14 dienu intervālu.

rūsu (*Gymnosporangium sabiniae*),
alternariozi (*Alternaria kikuchiana*).

Apstrādāt ar **0.075 - 0.1% preparāta darba šķīdumu** pumpuru plaukšanas laikā un atkārtoti ar 7 - 14 dienu intervālu.

bumbieru kraupi (*Venturia pirina*).

Apstrādāt ar **0.075 - 0.10% preparāta darba šķīdumu** 1. un 2. reizē, ko veic askusporu izlidošanas laikā un ziedēšanas beigās.

Apstrādāt ar **0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu** 3. un nākamajās apstrādēs, ko veic ar 8 - 14 dienu intervālu.

Vislabāko efektivitāti bumbieru kraupja ierobežošanā var panākt, lietojot Effector sistēmā ar fungicīdu Candit (škat. 43. lpp.).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 6 reizes.

Nogaidīšanas laiks: 21 diena.

Ķiršu stādījumos Effector ir efektīvs pret:

augļu parasto puvi (*Monilinia = Monilia spp.*).

Apstrādi veikt ķiršu ziedēšanas sākumā, ziediem nobirstot un 4 nedēļas pirms novākšanas ar **0.075 - 0.10% preparāta darba šķīdumu** (atbilst 7.5 - 10 g Effector uz 10 l ūdens).

ķiršu lapbiri (*Coccomyces hiemalis = Blumeriella jaapii*).

Apstrādi veikt ar **0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu** pirms ziedēšanas, ziedēšanas beigās un atkārtoti pēc 14 dienām.

ķiršu kraupi (*Venturia cerasi*).

Apstrādi veikt ar **0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu** pumpuriem plaukšot un atkārtoti pēc 14 dienām.

kauleņkoku sausplankumainību (*Clasterosporium carpophilum*).

Apstrādāt ar **0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu** rudenī, lapu biršanas laikā un atkārtoti pavasarī, ziedēšanas sākumā.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 6 reizes.

Nogaidīšanas laiks: 28 diena.

Plūmju stādījumos Effector ir efektīvs pret:

plūmju rūsu (*Tranzschelia pruni-spinosae*).

Apstrādi veikt ar **0.075 - 0.10% preparāta darba šķīdumu**.

1. apstrāde, sākoties augļaižmetņu biršanai, nākošā – atkārtoti pēc 1 mēneša, bet ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms ražas novākšanas. (koncentrācija atbilst 7.5 - 10 g Effector uz 10 l ūdens).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 3 reizes.

Nogaidīšanas laiks: 28 dienas.

Upeņu, jāņogu un ērkšķogu stādījumos Effector ir efektīvs pret:

rūsu (*Cronartium ribicola*),

lapu plankumainību (*Drepanopeziza ribis*).

Apstrādi veikt ar **0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu**.

1. apstrādi veikt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, nākamo – pirms ziedēšanas un pēdējo pēc ražas novākšanas (koncentrācija atbilst 5 - 7.5 gramiem Effector uz 10 l ūdens).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 3 reizes.

Nogaidīšanas laiks: 28 dienas.

Aveņu stādījumos Effector ir efektīvs pret:

avenāju mizas plaisāšanu (*Didymella applanata*),

dzinumu iedegām (*Sphaceloma necator*).

Apstrādi veikt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas ar **0.075 - 0.1% preparāta darba šķīdumu** (koncentrācija atbilst 7.5 - 10 gramiem Effector uz 10 l ūdens).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2 reizes.

leteicamais darba šķīduma daudzums. Ābelēm, bumbierēm, ķiršiem, plūmēm - 500 l/ha uz 1m vainaga augstuma (piemēram: 1.5 m augstiem augļu kokiem - 750 l/ha), ogulājiem - 500 l/ha.

Tvertnes maisījumi: Effector var lietot tvertnes maisījumos ar fungicīdu Candit un insekticīdiem, piemēram, Fastac 50.

Ievērojiet! Nelietot Effector maisījumos ar koloidālo sēru un sārmainām vielām (kalķis, sērkalķis, Bordo maisījums) vai eļļām.

Briesmas

H301, H317, H318, H351, H410, EUH401, P201, P261a, P301+P310, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313, P333+P313, P330, P363, P391, P501, SP1, SPe3*

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izpildīt lietošanas instrukcijas prasības.