

Aizsargiepakojuma marķējums

**HERBICĪDS**  
**Mustang™ Forte**  
**Mustangs Forte s.e.**

**APSTIPRINU**  
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļas vadītāja

R. Čūdera

2016.g. 06. 25.

**Preparatīvā forma:** suspo - emulsija

**Darbīgās vielas:** aminopiralīds 10 g/l, florasulams 5 g/l, 2,4-D 180 g/l

**Reģistrācijas Nr.:** 0334

**Reģistrācijas klase:** 2

**Iepakojums:** 4 x 5 L



**Uzmanību**

H302 Kaitīgs, ja norij.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.

P301+P312 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Sazinieties ar **SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU**/ārstu ja jums ir slikta pašsajūta.

P302+P352 **SASKARĒ AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/netūrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPE 3 Lai aizsargātu kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.

**Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**Uzglabāšana.** Uzglabāt slēgtā oriģināla iepakojumā. Sargāt no pārkaršanas. Uzglabāt temperatūrā no 0 līdz 30 °C. Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

**Partijas numurs/izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma.

**Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:**

Dow AgroSciences Danmark A/S

Sorgenfrivej 15

DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark

**Importētājs:**

Berner Eestli OÜ

Ehitajate tee 114, pk 27

13517, Tallinn, Estonia

**Berner/Dow AgroSciences pārstāvniecība Latvijā:**

Graudu iela 58

LV – 1058, Rīga, Latvija

Tālr./Fakss: 67412073

**SANĒMTS Nr. 58**  
Valsts augu aizsardzības dienesta  
Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļā  
2016.g. 06. 25. J. Čūderis

® TMTrademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

**HERBICĪDS**  
**Mustang™ Forte**  
**Mustangs Forte s.e.**

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un auzu sējumos.

**Preparatīvā forma:** suspo - emulsija

**Darbīgās vielas:** aminopiralīds 10 g/l, florasulams 5 g/l, 2,4-D 180 g/l

**Reģistrācijas Nr.:** 0334

**Reģistrācijas klase:** 2

**Iepakojums:** 5 L



**Uzmanību**

H302 Kaitīgs, ja norij.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.

P301+P312 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Sazinieties ar **SAINDEŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU**/ārstu ja jums ir slikta pašsajūta.

P302+P352 **SASKARĒ AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe 3 Lai aizsargātu kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.

**Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**Uzglabāšana.** Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no pārkaršanas. Uzglabāt temperatūrā no 0 līdz 30 °C. Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

**Partijas numurs/izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma.

**Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:**

Dow AgroSciences Danmark A/S

Sorgenfrivej 15

DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark

**Importētājs:**

Berner Eesti OÜ

Ehitajate tee 114, pk 27

13517, Tallinn, Estonia

**Berner/Dow AgroSciences pārstāvnieceība Latvija:**

Graudu iela 58

LV – 1058, Rīga, Latvija

Tālr./Fakss: 67412073

### **Pirmā palīdzība**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

**Saīdēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473**

### **Drošības prasības un personāla drošība**

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

### **PREPARĀTS UN TĀ IEDARBĪBAS VEIDS**

**Mustangs Forte s.e.** ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un auzu sējumos. Tas galvenokārt tiek uzņemts caur augu lapām un pēc tam izplatās pa visu augu.

**Mustangs Forte s.e.** formulācija ir suspo-emulsija un tas satur darbīgās vielas aminopiralīdu 10 g/l, florasulamu 5 g/l, un 2.4-D 180 g/l. Florasulam pieder pie triazolopirimidīnu sulfonilīdu atvasinājumiem, kuri ietilpst herbicīdu klasē, kas iedarbojas inhibējot acetolaktāta sintēzi (ALS) augos (B grupas preparāti, pēc HRAC), bet aminopiralīds un 2.4-D pieder pie organisko skābju atvasinājumu herbicīdiem (O grupas preparāti pēc HRAC). Visas darbīgās vielas sistēmiski izplatās pa visu augu un izjauc normālus augu augšanas procesus, izraisot jutīgu augu sugu bojāeju.

### **LIETOŠANAS DEVAS**

**Mustangs Forte s.e.** ziemas kviešu, rudzu, tritikāles un ziemas miežu sējumos lietošanas deva ir 0.8-1.0 l/ha, bet vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos lietošanas deva ir 0.6-0.8 l/ha.

### **LIETOŠANAS LAIKS**

**Mustangs Forte s.e.** var lietot ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos pavasarī atsākoties veģetācijai līdz graudaugu 2 mezglu stadijai (AS 32), vasaras kviešu, vasaras miežu, un auzu sējumos sākot no graudaugu cerošanas fāzes sākuma līdz 2 mezglu stadijai (AS 21-32). Optimālā lietošanas temperatūra ir no +5 līdz +20 °C.

Nesmidzināt ilgstoša sausuma periodā, kā arī ļoti karstā vai aukstā laikā. Apstrādi neveikt uzreiz pēc salnām. Apstrādi ar **Mustangs Forte s.e.** veic nezāļu aktīvas augšanas laikā.

### **SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA**

**Mustangs Forte s.e.** izsmidzināšanai var izmantot jebkāda tipa smidzinātājus, nodrošinot to augstu darba kvalitāti saskaņā ar smidzinātāja ražotāja ieteikumiem.

### **KULTŪRAUGI**

**Mustangs Forte s.e.** var lietot visās ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu, tritikāles un rudzu šķirnēs. Nelietojiet **Mustangs Forte s.e.** graudaugos ar tauriņziežu pasēju!

**Maksimālais apstrāžu skaits sezonā:** viena reize

### **Piezīme.**

Lai aizsargātu kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.

## AUGSNE

**Mustangs Forte s.e.** var tikt lietots visos augsnes tipos. Viegļās augsnēs reizēm var novērot augu bālēšanu, bet tas ir pārejošs simptoms un tas neatstāj nekādu ietekmi uz kultūrauga ražu.

## PĒCKULTŪRAS

Pastāv ierobežojumi kultūraugu izvēlē pēc **Mustangs Forte s.e.** lietošanas maksimālajā devā 0.8 – 1.0 l/ha:

Kultūraugi, kurus var sēt tajā pašā kalendārajā gadā pēc **Mustangs Forte s.e.** lietošanas: ziemāju graudaugi, ziemas rapsis, stiebrzāles.

Kultūraugi, kurus var sēt nākošajā gadā pēc **Mustangs Forte s.e.** lietošanas: vasarāju graudaugi, vasaras rapsis, kukurūza.

Citu kultūraugu audzēšanai ieteicamais nogaidīšanas periods ir 14 mēneši pēc **Mustangs Forte s.e.** lietošanas.

## PĀRSĒJA

Gadījumā, ja apstrādāts kultūraugs ir gājis bojā (salnas, slimības, kaitēkļi), obligāti ir jāveic augsnes aršana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.

## DARBA ŠĶIDRUMA PATĒRIŅŠ

Izsmidzinot **Mustangs Forte s.e.** darba šķidrums patēriņam jābūt 100 līdz 300 litri uz 1 hektāru. Mazāko darba šķidrums patēriņu var lietot apsmidzinot kultūraugu un nezāles to agrīnā attīstības stadijā.

## SMIDZINĀŠANAS KVALITĀTE

Izsmidzinot **Mustangs Forte s.e.** lietojiet sprauslas, kas nodrošina smalku līdz vidēju pilienu lielumu. Sprauslas, kas nodrošina vidēju līdz rupju pilienu lielumu, nav piemērotas **Mustangs Forte s.e.** izsmidzināšanai, jo tādejādi var samazināties produkta iedarbības efektivitāte.

## DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Piepildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar ūdeni, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet vajadzīgo **Mustangs Forte s.e.** daudzumu un, nepārtraucot maisīšanu, piepildiet tvertni ar atlikušo ūdens daudzumu. Nepārtrauciet maisīšanu līdz smidzināšanas beigām. Lietojiet tīru ūdeni!

Ja smidzinātājam ir atsevišķa darba šķidrums sagatavošanas tvertne, darba secībai jābūt nedaudz atšķirīgai (šī metode ir pielietojama tikai smidzinātājiem, kuriem šī tvertne var tikt piepildīta ar ūdeni): Piepildiet darba šķidrums sagatavošanas tvertni līdz pusei ar ūdeni, pievienojiet tajā nepieciešamo **Mustangs Forte s.e.** daudzumu. Atveriet vārstu un pārsūknējiet sagatavoto maisījumu izsmidzināšanas tvertnē, tai pašā laikā pievienojot tīru ūdeni darba šķidrums sagatavošanas tvertnē. Atkārtojiet to līdz tvertne ir iztīrīta no produkta atliekām. Pārliecinieties, ka darba šķidrums sagatavošanas tvertne ir tīra pirms pievienojiet citu produktu tvertnes maisījumam.

## Nezāļu iedalījums pēc to jutības pret produktu, lietojot **Mustangs Forte s.e.** devā 0.8 l/ha:

**Jūtīgas sugas (>90%):** krustzieži (*Brassica spp.*), ganu plikstiņš (*Capsella bursa-pastoris*), baltā balanda (*Chenopodium album*), ķeraņu madara (*Galium aparine*), ģerānijas (*Geranium spp.*) tīruma kumelīte (*Matricaria inodora*), ārstniecības kumelīte (*Matricaria recutita*), tīruma neaizmirstule (*Myosotis arvensis*), dārzu vējgriķis (*Polygonum convolvulus*), tīrumu pērkone (*Raphanus raphanistrum*), tīruma sinepes (*Sinapis arvensis*), parastā virza (*Stellaria media*).

**Vidēji jutīgas sugas (70-90%):** tīruma usne (*Cirsium arvense*), sējumu krizantēma (*Chrysanthemum segetum*), saules dievkrēsliņš (*Euphorbia helioscopia*) asais aklis (*Galeopsis tetrahit*), tīrumu naudulis (*Thlaspi arvense*), tīruma vijolīte (*Viola arvensis*).

**Efektivitāte <70%:** ārstniecības matuzāle (*Fumaria officinalis*), panātres (*Lamium spp.*), mīkstpienes (*Sonchus spp.*), veronikas (*Veronica spp.*)

**Mustangs Forte s.e.** nodrošina labu efektivitāti pret aktīvi augošām nezālēm. Virsmas aktīvās vielas pievienošana nav nepieciešama, jo tā jau ir iekļauta produkta formulācijā.

## LIETUS NOTURĪBA

Nepieciešamais bezlietus periods pēc **Mustangs Forte s.e.** lietošanas ir 1 stunda.

## BRĪDINĀJUMS

Pievērsiet īpašu uzmanību šķidrā slāpekļa mēslojuma un augu augšanu regulatoru lietošanai!

Tvertnes maisījums **Mustangs Forte s.e.** ar šķidro slāpekļa mēslojumu var radīt kultūraugu bojājumus. Ievērojiet 7 dienu nogaidīšanas periodu pirms un pēc apstrādes ar **Mustangs Forte s.e.**, lai lietotu šķidro slāpekļa mēslojumu.

Nelietojiet **Mustangs Forte s.e.** tvertnes maisījumos ar augu augšanas regulatoriem! Ievērojiet 7 dienu nogaidīšanas periodu starp apstrādēm!

## UZMANĪBU

**Mustangs Forte s.e.** sadalīšanās produkti augu pēcpļaujas atliekās, kuras nav pilnībā sadalījušās, var ietekmēt jutīgus kultūraugus.

Nogaidīšanas periods sekojošā kultūrauga sējai ir atkarīgs no tā sugas, laika apstākļiem, kā arī no pielietotās tehnoloģijas. Lai veicinātu produkta pilnīgu sadalīšanos ar augu pēcpļaujas atliekām, veiciet to sasmalcināšanu un iestrādi augsnē tūlīt pēc ražas novākšanas. Aminopirālīda sadalīšanos augu pēcpļaujas atliekās veicina silta un mitra augsne, process var tikt paātrināts, veicot laistīšanu.

Kultūraugi, kas var tikt audzēti pēc **Mustangs Forte s.e.** lietošanas:

- pēc priekšauga ražas novākšanas: ziemāju labības, ziemas rapsis, stiebrzāles;
- pēc 10-13 mēnešiem: visi iepriekšminētie, kā arī vasarāju graudaugi un vasaras rapsis;
- pēc vairāk kā 14 mēnešiem; visi iepriekšminētie, kā arī saulespuķes, kartupeļi, cukurbietes, lucerna, burkāni, sīpoli, lini, soja, pupas, zirņi.

Nogaidīšanas periods pirms jutīgu kultūraugu audzēšanas ir atkarīgs arī no laika apstākļiem un lietotās augsnes apstrādes tehnoloģijas.

**Mustangs Forte s.e.** sadalīšanās produkti augu pēcpļaujas atliekās (arī ar organisko mēslojumu), kuras nav pilnībā sadalījušās, var ietekmēt jutīgus kultūraugus – zirņus, pupas un citus tauriņziežus, burkānus un citus čemurziežus, kartupeļus, tomātus un citus nakteņu dzimtas augus, salātus un citus kurvjziežu dzimtas augus. Neaudzējiet jutīgus kultūraugus, izņemot minētos sadaļā „Pēckultūras”, laukā, kurā lietots **Mustangs Forte s.e.** vai arī kur ir lietots organiskais mēslojums no dzīvniekiem, kuriem ir izbarotas ar **Mustangs Forte s.e.** apstrādātas augu pēcpļaujas atliekas, vai arī tās ir izmantotas par pakaišu materiālu.

Organiskais mēslojums, kurā var būt nonākušas augu pēcpļaujas atliekas, kas bijušas apstrādātas ar **Mustangs Forte s.e.** ir jāiestrādā augsnē vismaz 7 mēnešus pirms cukurbiešu, kartupeļu, dārzeņu (tomātu, salātu, ķirbju dzimtas augu, u.c.) vai tauriņziežu audzēšanas.

Nelietojiet ar **Mustangs Forte s.e.** apstrādātas augu pēcpļaujas atliekas kompostiem vai kā mulču. Nelietojiet organisko mēslojumu no dzīvniekiem, kuriem ir izbarotas ar **Mustangs Forte s.e.** apstrādātas augu pēcpļaujas atliekas, kā kompostu.

Ievērojiet „Labas lauksaimniecības prakses” nosacījumus un pirms jutīgu kultūraugu audzēšanas pārliecinieties, ka pēcpļaujas atliekas pēc **Mustangs Forte s.e.** lietošanas ir pilnībā sadalījušās.

## PRETRESISTENCES STRATĒGIJA

Atkārtota herbicīdu lietošana ar vienu un to pašu iedarbības mehānismu vienā un tai pašā laukā pret vienām un tām pašām nezālēm var radīt rezistentas nezāļu populācijas izveidošanos.

Lai novērstu vai aizkavētu rezistences izveidošanos, rekomendējam lietot herbicīdus ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem augsekas rotācijas laikā vai arī veidot to tvertnes maisījumus.

**Mustangs Forte s.e.** satur florasulam, kas iedarbojas kā ALS inhibitors. Lai novērstu rezistences veidošanos, lietojiet **Mustangs Forte s.e.** tikai vienreiz sezonas laikā. Nav ieteicams lietot kādu citu herbicīdu, kura sastāvā ir darbīgā viela, kas iedarbojas kā ALS inhibitors, tajā pašā laukā vienas sezonas laikā ne pirms, ne arī pēc **Mustangs Forte s.e.** lietošanas, bet ir pieļaujams veidot tvertnes

maisījumus, lai paplašinātu produktu iedarbības spektru. Aminopirālīdam un 2.4-D ir līdzīgs iedarbības mehānisms kā citām organisko skābju atvasinājumu darbīgajām vielām, taču šīs grupas preparāti nerada nopietnus draudus rezistences izveidošanās veicināšanai.

### **SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA**

Lai novērstu nākošo apstrādājamo kultūraugu, izņemot graudaugus, iespējamus bojājumus, smidzināšanas iekārta pēc lietošanas ir rūpīgi jānomazgā gan no iekšpuses, gan ārpusē, lietojot speciālo mazgāšanas līdzekli All Clear Extra.

1. Iztukšojiet smidzinātāju uz lauka pilnībā. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām nomazgājiet to no ārpusē.
2. Izskalojiet smidzinātāja tvertni ar tīru ūdeni un iztukšojiet to, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz tikko apsmidzinātā lauka. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
3. Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni līdz pusei un pievienojiet rekomendēto daudzumu All Clear Extra. Samaisiet un izsmidziniet nelielu daudzumu šķidruma caur sprauslām. Piepildiet tvertni pilnu ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju uz 15 minūtēm. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
4. Sprauslas un filtri jānoņem un jāizmazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear Extra 50 ml uz 10 litriem ūdens.
5. Skalojiet tvertni ar tīru ūdeni. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
6. Mazgāšanas un skalošanas ūdeņi jānovirza vietās, kur tie nevar nodarīt kaitējumu apkārtējai videi un nevar nonākt gruntsūdeņos vai virszemes ūdens tilpnēs. Neizsmidzināt uz jutīgiem kultūraugiem vai tīrumos, kur tos paredzēts audzēt.

Piezīme: Ja tvertni nav iespējams iztukšot pilnībā, 3. punktā minētās darbība ir jāatkārto, pirms veic 4. punktā minētos pasākumus.

### **VIDES AIZSARDZĪBA**

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietvertu likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

### **TUKŠĀ TARA**

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā, un to likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

### **UZGLABĀŠANA**

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no pārkaršanas. Uzglabāt temperatūrā no 0 līdz 30°C. Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

### **JURIDISKĀ ATBILDĪBA**

Visi mūsu piegādātie produkti ir augstas kvalitātes un mēs esam pārliecināti par to piemērotību lietošanai, taču tā kā mēs nevaram nodrošināt kontroli pār uzglabāšanu, transportēšanu, jaukšanu un lietošanu, kā arī par laika apstākļiem pirms apstrādes, apstrādes brīdī un pēc apstrādes, kas var ietekmēt produkta iedarbības efektivitāti, visi nosacījumi un garantijas, likumā noteiktās vai citas, attiecībā uz mūsu produkta kvalitāti vai piemērotību jebkādai tā lietošanai, nav ietverti. Ne mēs, ne mūsu tirdzniecības partneri neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā. Šos nosacījumus nevar mainīt ne mūsu darbinieki, ne pārstāvji, neatkarīgi no tā, vai tie pārrauga vai piedalās produktu lietošanā.

**Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:**

Dow AgroSciences Danmark A/S  
Sorgenfrivej 15  
DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark

**Importētājs:**

Berner Eesti OÜ  
Ehitajate tee 114, pk 27  
13517, Tallinn, Estonia

**Berner/Dow AgroSciences pārstāvniecība Latvija:**

Graudu iela 58  
LV – 1058, Rīga, Latvija  
Tālr./Fakss: 67412073

® <sup>TM</sup>Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow